



## GLICERINA 2,88g SUPOSITORIOS

**Composición:** Glicerina 2,88g, Ácido esteárico, Bicarbonato de sodio y Cloruro de sodio.

**Indicación:** Laxante en condiciones que requieran evacuación rápida de la ampolla rectal.

**Vía de administración:** Rectal.

**Posología (Dosis recomendada):** Niños mayores de 12 años y Adultos: Un (01) supositorio por vía rectal una vez al día.

**Advertencias:** En caso de dolor abdominal, náuseas, vómitos y otros síntomas digestivos no usar este producto sin consultar al médico. Si los síntomas no ceden con el tratamiento luego de 24 a 48 horas, suspéndase su uso y consulte al médico. El uso prolongado de este producto, mayor a una semana, puede dar lugar a trastornos del colon. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Precauciones:** Evítese el uso indiscriminado de este producto debido a que aumenta el riesgo de reacciones adversas. La administración de este producto en uso prolongado, por persistencia de los síntomas, debe hacerse por recomendación del médico.

**Contraindicaciones:** Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con colitis hemorrágica, crisis hemorroidal aguda, deshidratación severa, diabetes mellitus, enfermedad renal, hipervolemia.